



GIMBE®
Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze
Evidence-Based Medicine Italian Group

Workshop
Evidence-based Medicine
Le opportunità di un linguaggio comune 2ª ed.
Como, 21-22 maggio 2004
Sezione di Como

Workshop Clinici Interattivi

Copyright © - GIMBE®




Livelli di Evidenza e Forza delle Raccomandazioni

Livello di Evidenza	
Ia	Revisioni sistematiche di studi clinici randomizzati
Ib	Almeno uno studio clinico controllato e randomizzato
Ila	Almeno uno studio clinico controllato non randomizzato
Ilb	Altri tipi di studi controllati di buona qualità
III	Studi non controllati di buona qualità (serie di casi, studi di correlazione, studi descrittivi)
IV	Opinione di esperti
Forza delle Raccomandazioni	
A	Basate su informazioni scientifiche di livello Ia o Ib
B	Basate su informazioni scientifiche di livello Ila, Ilb o III
C	Basate unicamente su opinioni di esperti (livello IV)

Programma Nazionale Linee Guida. Maggio 2000

Copyright © - GIMBE®



- ### Classificazione degli interventi terapeutici
1. Utile
 2. Probabilmente utile
 3. Da valutare caso per caso
 4. Di utilità non determinata
 5. Di utilità discutibile
 6. Inutile o dannoso
- Clinical Evidence
Versione Italiana. Luglio 2003
- Copyright © - GIMBE®

Intervention	Icon	Description
Beneficial		for which effectiveness has been demonstrated by clear evidence from RCTs, and for which expectation of harms is small compared with the benefits.
Likely to be beneficial		for which effectiveness is less well established than for those listed under "beneficial".
Trade off between benefits and harms		for which clinicians and patients should weigh up the beneficial and harmful effects according to individual circumstances and priorities.
Unknown effectiveness		for which there are currently insufficient data or data of inadequate quality.
Unlikely to be beneficial		for which lack of effectiveness is less well established than for those listed under "likely to be ineffective or harmful".
Likely to be ineffective or harmful		for which ineffectiveness or harmfulness has been demonstrated by clear evidence.

Copyright © - GIMBE®

Clinical Evidence
March 2004

1. Searching: fonti secondarie

Linee guida →

- National Guideline Clearinghouse
- CMA Infobase
- NeLH Guidelines Finder
- Altre banche dati di LG
- MEDLINE (filtro LG)

Evidence-summary →

- *Clinical Evidence* (March 2004)

Revisioni sistematiche →

- *Cochrane Library* (issue 1, 2004)
- MEDLINE (filtro RS)

Copyright © - GIMBE®

1. Searching: studi primari

RCTs
Studi osservazionali →

- MEDLINE
- *Best-Evidence 5*

Copyright © - GIMBE®

2. Critical Appraisal

User's Guide to Biomedical Literature
JAMA 1993-2000

AGREE Instrument
(final version, 9-2001)

www.agreecollaboration.org

Copyright © - GIMBE®

Workshop clinici interattivi

• Presentazione del caso e dei quesiti fondamentali	15'
• Votazione elettronica	5'
• Presentazione dell'evidence: validità interna	20'
• Opinioni dei discussant sulla applicabilità clinica dell'evidence	20'
• Verifica risultati	10'
• Discussione generale e conclusioni	20'

Copyright © - GIMBE®

www.gimbe.org/eventi/snamidcomo2004

Copyright © - GIMBE®

